

УДК 512.552.1

## НАПІВДОСКОНАЛІ КІЛЬЦЯ ДИСТРИБУТИВНО МОДУЛЬНОГО ТИПУ

Ю. В. Яременко

Доведено, що напівдосконалі кільця дистрибутивно модульного типу є бірядними кільцями.

We prove that any noetherian semi-perfect ring of distributive module type is biserial.

В статті розглядаються асоціативні кільця з  $1 \neq 0$ .

Важливу роль в теорії кілець і модулів відіграють різноманітні умови скінченності, зокрема, умови обриву ланцюжків підмодулів та односторонніх ідеалів.

Нагадаємо, що модуль  $M$  називається *нетеровим (артиновим)*, якщо кожна непорожня множина його підмодулів містить максимальний (мінімальний) елемент.

Кільце  $A$  називається *артиновим (нетеровим) справа*, якщо воно, розглянуте як правий модуль над собою, являється артиновим (нетеровим).

Кільце цілих чисел являється, очевидно, нетеровим, але не артиновим.

*Радикалом Джекобсона*  $R$  кільця  $A$  називається перетин всіх його максимальних правих ідеалів [1].

Кільце  $A$  називається *напівдосконалим*, якщо факторкільце  $A/R$  артинове і ідемпотенти можна піднімати за модулем радикала Джекобсона  $R$  кільця  $A$  [2].

Ідемпотенти можна піднімати за модулем  $R$ , якщо для будь-якого елемента  $u \in A$ , для якого  $u^2 - u \in R$  існує елемент  $e^2 = e \in A$  такий, що  $e - u \in R$  (тобто існує ідемпотент  $e$  в кільці  $A$  конгруентний з елементом  $u$  за модулем  $R$ ).

**Теорема 1** [2]. *Кільце  $A$  напівдосконале тоді і тільки тоді, коли  $1 \in A$  розкладається в суму попарно ортогональних локальних ідемпотентів.*

Нехай  $1 = e_1 + \dots + e_n$  – розклад одиниці кільця  $A$  в суму попарно ортогональних локальних ідемпотентів і  $a = 1a1 = (e_1 + \dots + e_n)a(e_1 + \dots + e_n) =$

$$= \sum_{i,j=1}^n e_i a e_j.$$

Неважко перевірити, що це розклад кільця  $A$  в пряму суму абелевих груп  $e_i A e_j$  ( $i, j = 1, \dots, n$ ). Елементи із  $e_i A e_j$  ми будемо позначати через  $a_{ij}$ . Будь-який елемент  $a \in A$  зручно записувати у вигляді матриці  $(a_{ij})$ . Кільце  $A$  зображується таким чином у вигляді кільця матриць з елементами із  $A_{ij} = e_i A e_j$  з звичайними операціями додавання і множення. Таке представлення називається *двостороннім пірсовським розкладом кільця  $A$* .

Артинові бірядні кільця ввів Фуллер [3] в зв'язку з вивченням кілець дистрибутивно модульного типу. В роботі [4] поняття бірядного кільця перенесено на напівдосконалі кільця.

Модуль  $M$  називається *дистрибутивним*, якщо для будь-яких його підмодулів  $K, L, N$  виконується умова:  $K \cap (L + N) = K \cap L + K \cap N$ .

Ясно, що підмодулі та фактор модулі дистрибутивного модуля також дистрибутивні.

Модуль називається *напівдистрибутивним*, якщо він є прямою сумою дистрибутивних модулів.

Ненульовий модуль  $M$  називається *простим*, якщо у нього рівно два підмодулі (сам  $M$  і нульовий підмодуль).

Модуль  $M$  називається *бірідним*, якщо він дистрибутивний і містить ланцюгові підмодулі  $K_1$  і  $K_2$  (можливо й рівні нулеві) такі, що  $K_1 + K_2 = M$ , або найбільший власний підмодуль в  $M$ , а  $K_1 \cap K_2 = 0$ , або простий модуль [4].

Напівдосконале кільце  $A$  називається *бірідним кільцем*, якщо кожний правий і кожний лівий головний  $A$  модуль бірідний [4].

**Теорема 2 [4].** Нехай  $e$  – довільний ідемпотент бірідного кільця  $A$ . Тоді  $eAe$  являється бірідним кільцем.

**Теорема 3 [5,с.281].** Кільце  $A$  напівдосконале тоді і тільки тоді, коли воно розпадається в пряму суму правих ідеалів, кожен з яких має рівно один максимальний підмодуль.

Напівдосконале кільце  $A$  з радикалом Джекобсона  $R$  називається *зведеним*, якщо  $A/R$  є прямим добутком тіл.

Модуль  $P$  називається *проективним*, якщо для будь-якого ізоморфізму  $\varphi$  модуля  $M$  на модуль  $N$  ( $\varphi: M \rightarrow N$ ) і для будь-якого гомоморфізму  $\psi: P \rightarrow N$  існує гомоморфізм  $h: P \rightarrow M$  такий, що  $\psi = \varphi h$  [6,с.132].

Підмодуль  $N$  модуля  $M$  називається *косуттєвим*, якщо з рівності  $N+X=M$  слідує, що  $X=M$  для довільного підмодуля  $X$  модуля  $M$ .

Проективний модуль  $P=P(M)$  називається *проективним накриттям* модуля  $M$ , якщо існує епіморфізм  $\varphi: P \rightarrow M$  такий, що  $\text{Ker } \varphi$  - косуттєвий підмодуль в  $P$ .

За теоремою Моріти [7] категорія модулів над довільним напівдосконалим кільцем натурально-еквівалентна категорії модулів над зведеним кільцем. Тому при вивченні напівдосконалих кілець можна обмежитись зведеними кільцями, а це означає, що в розкладі напівдосконалиого кільця  $A$  в пряму суму головних  $A$ -модулів немає ізоморфних. Отже, кільце  $A$  розкладатиметься в пряму суму нерозкладних проективних модулів:  $A = P_1 \oplus \dots \oplus P_s$

Нехай  $A$  – нетерове справа напівдосконале кільце з радикалом Джекобсона  $R$ .  $P_1, \dots, P_s$  – всі попарно неізоморфні проективні нерозкладні  $A$  модулі. Позначимо  $P(P_i R)$  – проективне накриття модуля  $(P_i R)$ . Тоді

$P(P_i R) = \bigoplus_{j=1}^s P_j^{t_{ij}}$ ,  $i, j = 1, \dots, s$ . Поставимо у відповідність модулям  $P_1, \dots, P_s$  точки

$1, \dots, s$  і сполучимо точку  $i$  з точкою  $j$   $t_{ij}$  – стрілками. Отриманий граф називається *сагайдаком* (позначається  $Q(A)$ ) нетерова справа напівдосконалиого кільця  $A$  [8].

Аналогічно визначається лівий сагайдак  $Q'(A)$  нетерового зліва напівдосконалого кільця  $A$ .

Відмітимо, що сагайдак напівдосконалого кільця не змінюється при переході до кілець, еквівалентних в сенсі Моріти. Очевидно, також, що  $Q(A) = Q(A/R^2)$ .

Модуль  $M$  називається *ланцюговим*, якщо структура його підмодулів лінійно впорядкована.

Пряма сума ланцюгових модулів називається *напівланцюговим модулем*.

Кільце  $A$  називається *напівланцюговим*, якщо воно являється напівланцюговим правим і напівланцюговим лівим модулем над собою.

Модуль  $M$  називається *скінченно зображуваним*, якщо існує точна послідовність  $P_1 \xrightarrow{\varphi} P_0 \xrightarrow{\psi} M \longrightarrow 0$ , де  $P_1$  і  $P_0$  скінченнопороджені модулі.

Напівдосконале кільце  $A$  називається *кільцем дистрибутивно модульного типу*, якщо довільний правий скінченно зображуваний  $A$ -модуль напівдистрибутивний, тобто пряма сума дистрибутивних модулів.

Важливим прикладом кілець дистрибутивно модульного типу являються напівланцюгові кільця.

Отже, для того, щоб показати скінченну зображуваність модуля  $M$  над напівдосконалим кільцем, потрібно перевірити скінченнопородженість модуля  $M$  і скінченнопородженість модуля  $\text{Ker}\Pi$ , де  $\Pi$  – епіморфізм проективного накриття  $P(M)$  модуля  $M$  на  $M$ .

**Теорема 4 [9].** Нехай  $A$  кільце дистрибутивно модульного типу.  $e^2 = e \in A$ . Тоді кільце  $eAe$  також є кільцем дистрибутивно модульного типу.

Нехай  $A$  – напівдосконале кільце дистрибутивно модульного типу,

$I = e_1 + \dots + e_n$  – розклад одиниці кільця  $A$  в суму попарно ортогональних локальних ідемпотентів,  $A_{ij} = e_i A e_j$ , ( $i, j = 1, \dots, n$ ).

**Теорема 5 [9].** Нехай  $A$  – напівдосконале кільце дистрибутивно модульного типу. Тоді  $A_{ij}$  є лівим ланцюговим  $A_{ii}$  – модулем і правим ланцюговим  $A_{jj}$  – модулем ( $i, j = 1, \dots, n$ ).

Для нетерових (артинових) кілець має місце теорема:

**Теорема 6 [8].** Якщо кільце  $A$  нетерове (артинове) справа, то кільце  $eAe$  і  $fAf$  – нетерові, (артинові) справа,  $fAf$  – модуль  $eAf$  та  $eAe$  – модуль  $fAe$  – скінченнопороджені. Навпаки, якщо ці умови виконані для деяких ідемпотентів  $e, f \in A$  таких, що  $e+f=1$ , то кільце  $A$  – нетерове (артинове) справа.

Кільце називається *напівдистрибутивним справа (зліва)*, якщо воно, розглянуте як правий (лівий) модуль над собою, є напівдистрибутивним.

Кільце, яке напівдистрибутивне справа і зліва називають *напівдистрибутивним*.

Враховуючи теорему 6, одержуємо такий наслідок.

**Наслідок 1.** Напівдосконале дистрибутивно модульного типу кільце – напівдистрибутивне.

Кільце  $A$  називається *локальним*, якщо у нього всього один максимальний правий ідеал.

В цьому випадку цей ідеал є радикалом Джекобсона  $R$  кільця  $A$ . Тому у кільця  $A$  всього один максимальний лівий ідеал.

З наслідка 1 і теорем 4 та 6 одержуємо наступне твердження.

**Твердження 1.** *Локальне дистрибутивно модульного типу кільце є ланцюговим.*

Слідуючи роботі [10] *мінором  $n$ -го порядку* кільця  $A$  називаємо кільце  $B$  ендоморфізмів скінченнопородженного проективного  $A$ -модуля, який може бути розкладений в пряму суму  $n$  нерозкладних модулів. З теореми 4 випливає наступний результат.

**Твердження 2.** *Будь-який мінор нетерового напівдосконалого кільця дистрибутивно модульного типу є нетеровим напівдосконалим кільцем дистрибутивно модульного типу.*

Згідно твердження 1 локальне дистрибутивно модульного типу кільце є ланцюговим. Отже:

**Наслідок 2** [8]. *Нетерове ланцюгове кільце  $A$  є дискретно нормованим кільцем (можливо некомутативним) або однорядним кільцем Кете, тобто ланцюговим артиновим кільцем.*

**Лема 1** [11]. *Якщо  $A$  – нетерове напівдосконале напівдистрибутивне кільце,  $I = e_1 + \dots + e_n$  – розклад  $I \in A$  в суму попарно ортогональних локальних ідемпотентів,  $A_{ij} = e_i A e_j$ ,  $R_i$  – радикал Джекобсона кільця  $A_{ii}$ , то  $R_i A_{ij} = A_{ij} R_j$  для всіх  $i, j = 1, \dots, n$ .*

Ідеал  $J$  кільця  $A$  називається *первинним*, якщо  $J \neq A$  і для будь-яких ідеалів  $L$  і  $N$  кільця  $A$  з включення  $LN \subset J$  випливає, що або  $L \subset J$ , або  $N \subset J$ .

*Первинним радикалом  $I$  кільця  $A$  називається перетин усіх первинних ідеалів кільця  $A$  [12, с.399].*

Кільце  $A$  називається *первинним*, якщо добуток будь-яких двох ненульових ідеалів не рівний нулю.

Введемо поняття первинного сагайдака напівдосконалого кільця.

Нехай  $\bar{1} = \bar{f}_1 + \dots + \bar{f}_t$  – розклад одиниці кільця  $\bar{A}$  в суму взаємно ортогональних ідемпотентів. Позначимо  $V = I/I^2$ . Поставимо у відповідність точкам  $1, \dots, t$  ідемпотенти  $\bar{f}_1, \dots, \bar{f}_t$  та проведемо стрілку з точки  $i$  в точку  $j$ , якщо  $\bar{f}_i V \bar{f}_j \neq 0$ . Отриманий граф називається *первинним сагайдаком* кільця  $A$ .

В роботах [9,13] описано зведені мінори другого і третього порядку нетерових напівдосконалих кілець дистрибутивно модульного типу, які використовуються при доведенні теореми:

**Теорема 7.** *Нетерове напівдосконале кільце дистрибутивно модульного типу – бірядне.*

*Доведення.* Розглянемо  $I$  – первинний радикал нетерового напівдосконалого дистрибутивно модульного типу кільця  $A$ . Тоді

$\bar{A} = A/I = \bar{A}_1 \times \dots \times \bar{A}_t$  – прямий добутком первинних кілець, які еквівалентні в сенсі Моріти або тілу  $D$ , або дискретно нормованому кільцю  $H_S(\mathcal{G})$ .

Вагою точки  $i$  первинного сагайдака називається кільце ендоморфізмів нерозкладного прективного  $\bar{A}_i$ -модуля тобто вага у нашому випадку може бути  $D$  або  $H_S(\mathcal{G})$ .

Якщо вага буде тільки  $D$ , то кільце  $A$  артинове і теорема доведена Колбі та Фулером [14].

Занумеруємо всі точки первинного сагайдака кільця  $A$  в такому порядку, щоб першими були точки з вагою  $H_S(\mathcal{G})$ :  $1, \dots, m$ , а вага точок  $m+1, \dots, t$  була  $D$  (може бути, що  $m=t$ ). Причому нумеруємо точки, вага яких є тілом  $D$  наступним чином:

- 1) першими будуть точки з  $R_k^2 \neq 0$ ,
- 2) далі йдуть точки з  $R_k^2 = 0$ , але  $R_k \neq 0$ ,
- 3)  $R_k = 0$ .

Отримаємо двосторонній пірсовський розклад кільця  $A$ :

$$A = \begin{pmatrix} H & \dots & \dots & \dots \\ \dots & B_3 & \dots & \dots \\ \dots & \dots & B_2 & \dots \\ \dots & \dots & \dots & B_1 \end{pmatrix}.$$

Кільце  $H$  відповідає точкам з вагою  $H_S(\mathcal{G})$ , тобто  $m$  першим точкам. Воно буде мати двосторонній пірсовський розклад:

$$H = \begin{pmatrix} H_{S_1} & A_{12} & \dots & A_{1m} \\ A_{21} & H_{S_2} & \dots & A_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{m1} & A_{m2} & \dots & H_{S_m} \end{pmatrix}.$$

Із опису мінорів другого порядку отримаємо лему:

**Лема 2.** Нехай  $e$  та  $f$ -локальні ідемпотенти кільця  $A$  і  $eAf \subseteq I$ . Тоді  $eAf$  є або нулем або одновимірним правим векторним простором над тілом ендоморфізмів правого простого модуля, який відповідає ідемпотенту  $f$  та або нулем або одновимірним лівим векторним простором над тілом ендоморфізмів лівого простого модуля, який відповідає ідемпотенту  $e$ .

**Теорема 8** [11]. Тіла ендоморфізмів всіх простих модулів над нетеровими нерозкладними напівдосконалими напівдистрибутивними кільцями ізоморфні між собою.

Враховуючи теорему 8, отримаємо наслідок

**Наслідок 3.** Всі компоненти  $A_{ij}$  в двосторонньому пірсовському розкладі кільця  $H$  є скінченновимірними векторними просторами.

Крім того, легко показати, що первинний сагайдак кільця  $H$  не містить орієнтованих циклів. В іншому випадку вага, по крайній мірі однієї точки в цьому циклі, була б тілом  $D$ . Таким чином, кільце  $H$  має верхній трикутний вигляд:

$$H = \begin{pmatrix} H_{S_1} & A_{12} & \dots & A_{1m} \\ 0 & H_{S_2} & \dots & A_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & H_{S_m} \end{pmatrix}.$$

З опису мінорів другого та третього порядку слідує, що існує  $k \in \mathbb{N}$ , таке, що  $A_{ij}R_j^k = R_i^k A_{ij} = 0$ , де  $R_i$  – радикал Джекобсона кільця  $H_{S_i}$  ( $i=1 \dots m$ ). Аналогічно, для кілець  $B_3, B_2, B_1$  виконується умова  $A_{ij}R_j^k = R_i^k A_{ij} = 0$ . Отже, двосторонній пірсівський розклад нетерового напівдосконалого кільця дистрибутивно модульного типу має вигляд:

$$A = \begin{pmatrix} H_{S_1} & A_{1,2} & \dots & A_{1,m} & A_{1,m+1} & A_{1,m+2} & A_{1,m+3} \\ 0 & H_{S_2} & \dots & A_{2,m} & A_{2,m+1} & A_{2,m+2} & A_{2,m+3} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 & H_{S_m} & A_{m,m+1} & A_{m,m+2} & A_{m,m+3} \\ A_{m+1,1} & \dots & \dots & A_{m+1,m} & B_3 & A_{m+1,m+2} & A_{m+1,m+3} \\ A_{m+2,1} & \dots & \dots & A_{m+2,m} & A_{m+2,m+1} & B_2 & A_{m+2,m+3} \\ A_{m+3,1} & \dots & \dots & A_{m+3,m} & A_{m+3,m+1} & A_{m+3,m+2} & B_1 \end{pmatrix},$$

де  $A_{ij}R_j^k = R_i^k A_{ij} = 0$ .

Розглянемо множину:

$$I_n = \begin{pmatrix} R_1^n & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R_2^n & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & R_m^n & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Легко перевірити, що  $I_n$  є двостороннім ідеалом кільця  $A$  для кожного  $n \geq k$ . Отже, факторкільце  $A_n = A/I_n$  є артиновим кільцем дистрибутивно модульного типу, яке є бірядним за теоремою Колбі–Фуллера [14] для кожного натурального номера  $n \geq k$ .

Покажемо, що будь-який нерозкладний проективний  $A$ -модуль є бірядним. Розглянемо, наприклад, модуль  $P_1 = (\vartheta, \vartheta, \dots, \vartheta, A_{12}, \dots, A_{1m+3})$ . Його найбільший підмодуль  $P_1R = (\mu, \vartheta, \dots, \vartheta, A_{12}, \dots, A_{1m+3})$ . Зрозуміло, що  $K_1 = (\mu, \vartheta, \dots, \vartheta, 0, \dots, 0)$  є ланцюговим модулем кільця  $A$ . Ланцюговим буде і  $A_n$ -модуль  $V_n = K_1/K_1R_1^n$  ( $n \in \mathbb{N}$ ), всі фактори якого вичерпуються простими модулями  $U_1, \dots, U_{s_1}$  [8]. Позначимо  $K_2 = (0, \dots, 0, A_{12}, \dots, A_{1m+3})$ . Він буде артиновим за лемою 2 та є  $A_n$ -модулем для кожного натурального номера  $n \geq k$ .

Нехай  $P_1^{(n)}$  – перший нерозкладний проективний  $A_n$ -модуль. Так як  $A_n$  – бірядне кільце, то єдиний максимальний підмодуль в  $P_1^{(n)}$  має вигляд  $K_1^{(n)} + K_2^{(n)}$ , де  $K_i^{(n)}$  ( $i=1,2$ ) – ланцюгові модулі.

Так як  $P_1^{(n)}$  дистрибутивний модуль, то  $(K_1^{(n)} + K_2^{(n)}) \cap V_n = K_1^{(n)} \cap V_n + K_2^{(n)} \cap V_n$ , і  $(K_1^{(n)} + K_2^{(n)}) \cap K_2 = K_1^{(n)} \cap K_2 + K_2^{(n)} \cap K_2$ .

В композиційному ряді модуля  $K_2$  немає фактормодулів ізоморфних  $U_1, \dots, U_{s_1}$ . З попередніх рівностей слідує, що  $K_1^{(n)} \cap V_n$  та  $K_2^{(n)} \cap V_n$  є підмодулі ланцюгового модуля  $V_n$ , тому можна вважати, що  $K_1^{(n)} \cap V_n \supseteq K_2^{(n)} \cap V_n$ , тобто  $V_n = K_1^{(n)} \cap V_n$  та  $V_n \subseteq K_1^{(n)}$ . Ми одержали, що цоколь модуля  $K_1^{(n)}$  співпадає з цоколем модуля  $V_n$  і рівний прямій сумі простих модулів  $U_1, \dots, U_{s_1}$ .

В розклад цокolia модуля  $K_2$  входять прості модулі  $U_{s_1+1}, \dots, U_{m+3}$ . Нехай модулі  $K_1^{(n)} \cap K_2$  та  $K_1^{(n)} \cap K_2$  є одночасно ненульовими. Так як цоколь  $K_1^{(n)}$  містить принаймні один з простих модулів  $U_k$  ( $k=1, \dots, s_1$ ), отримаємо, що і  $K_2$  містить цей модуль. Прийшли до протиріччя. Отже,  $K_1^{(n)} \cap K_2 = 0$  і  $K_2^{(n)} \cap K_2 = K_2$ , тобто  $K_2$  – ланцюговий модуль як підмодуль ланцюгового модуля  $K_2^{(n)}$ . Тому  $P_1R = (\mu, \vartheta, \dots, \vartheta, 0, \dots, 0) \oplus (0, \dots, 0, A_{12}, \dots, A_{1m+3}) = K_1 \oplus K_2$ .

Аналогічно доводиться, що будь-який нерозкладний проективний  $A$ -модуль – бірядний. Відмітимо, що нерозкладні проективні праві  $A$ -модулі  $P_{m+1}, P_{m+2}, P_{m+3}$  та ліві  $Q_{m+1}, Q_{m+2}, Q_{m+3}$  є бірядними автоматично, так як вони являються і  $A_n$ -модулями. Теорема 7 доведена.

### БІБЛІОГРАФІЯ

1. Джекобсон Н. Теория колец. – М.: ИЛ, 1947. – 288 с.
2. Bass H. Finitistic dimension and homological generalization of semiprimary rings // Trans. Amer. Math. Soc. – 1960. – V. 95. – P. 466-488.
3. Fuller K.R. Weakly symmetric rings of distributive module type // Comm. in Algebra. – 1977. – № 5. – P. 997-1008.
4. Кириченко В.В., Костюкевич П.П. Бирядные кольца // Укр. мат. журнал. – 1986. – Т.38, № 6. – С. 718-723.
5. Каш Ф. Модули и кольца. – М.: Мир, 1981. – 368 с.
6. Ламбек И. Кольца и модули. – М.: Мир, 1971. – 280 с.
7. Morita K., Duality for modules and its applications to the theory of rings with minimum condition // Sc. Rep. Tokyo Kyoiku Daigaku. 1958. – V. 6. – P. 83-142.
8. Кириченко В.В. Обобщенно однорядные кольца // Мат. сб. – 1976. – Т. 99, № 4. – С. 559-581.

9. Яременко Ю.В. Мінори нетерових напівдосконалих кілець дистрибутивно модульного типу // Вісник Київського університету. Фізико-математичні науки. – 1998. - №2. – С. 159-168.
10. Drozd Yu. A. Minors and reduction theorems // Coll Math. Soc. J. Bolyai. – 1971. – V. 6. – P. 173-176.
11. Кириченко В.В., Хибина М.А. Полусовершенные полудистрибутивные кольца // Бесконечные группы и примыкающие алгебраические структуры. – К.: Ин-т математики, 1993. – С. 457-480.
12. Фейс К. Алгебра: кольца, модули и категории. – М.: Мир, 1979. – Т. 2. – 464 с.
13. Yaremenko Yu.V. Noetherian semiperfekt rings of distributive module type // Matematychni Studii. – 1997. – V. 8, №1. – P. 3-10.
14. Colby R.R., Fuller K.R. Modules over diserial rings // Comm. In Algebra. – 1981. – № 9. – P. 511-532.